












































Formidol 41 g proužky do úlu

Obsah léčivé látky
Léková forma
Velikost balení

Acidum formicum 41 g
Proužek do úlu
20 proužků
120 proužků

Cílový druh zvířat Včelstva včely medonosné (*Apis mellifera*)

Způsob a cesta podání

Deska v regulačním obalu se umístí na horní loučky nebo mezi nástavky.
Po odpaření poloviny obsahu kyseliny mravenčí se regulační obal odstraní.
Čtěte příbalovou informaci.

Ochranná lhůta

Med. Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít v období mimo snůšku a mimo dobu kdy je ve včelstvu med určený pro lidskou spotřebu.

Pracujte v rukavicích a s brýlemi.

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

Pouze pro zvířata. Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.



Jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci

Výzkumný ústav včelářský, s.r.o.

Mladá Vožice – Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

tel.: 220 941 259, fax: 220 941 252

e-mail: becdol@bcdol.cz


Registrační číslo 000000000

Číslo šarže: 10080819

Datum expirace: 02/2021


Dotazy poskytnutí po prvním obdržení listiny. Pro další poskytnutí kontaktujte výrobce.
Pro poskytnutí certifikátů o analýze vzorků kontaktujte výrobce.

3



Desku v regulačním obalu
vyjměte ze sáčku.


4



Umístěte desku orazítkovanou
stranou směrem do úlu.
Ujistěte se, že odparné otvory
směřují přímo do uliček.




1





Vložte do podmetu očištěnou
monitorovací podložku.


2



=




=




1 nástavek s plodem - 1 proužek,
2–3 nástavky s plodem - 2 proužky

6



Fumigační pásek v horní části proděravte a navlékněte na háček či na hřebík.

7




Na jeden obsednutý nástavek nakapejte 2 kapky přípravku na horní část proužku. Pro silná včelstva použijte 3 kapky.

8




Pásek zapalte ve spodní části
(pozor, pásek musí pouze doutnat,
nesmí hořet).

9




Doutnající pásek vložte do
předem připraveného místa
a úl uzavřete.

3




Umístěte proužek na háček.



Na dvou místech mezi plodovými plásty rozšířte mezeru pro vložení gabonových proužků.

8





7

Proužky vždy musí být u plodového tělesa! Proužky vložené do místa, kde se nenacházejí včely jsou neúčinné.

Proužky nechte v úlu po dobu 2 period zavičkování plodu – tj. 24 dní.

Proužky je dobré
umístit úhlopříčně
ke středu nástavku,
aby byla účinná
látka co nejlépe
distribována.



Vložte proužky mezi pláсты.

9



10

Nejpozději po 30 dnech
proužek vyjměte.
Nenechávejte proužky
v úlu delší dobu. Hrozí
rezistence roztočů!













veřst.cz








vcfst.cz









vefct.cz